

## 給公眾預防嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病的健康指引

衛生署建議市民採取以下預防措施，以儘量減低感染和傳播嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病的風險。

### 疾病資訊

<https://www.chp.gov.hk/tc/healthtopics/content/24/102466.html>

### 給公眾的健康建議

- 應避免接觸動物（包括野味）、禽鳥或其糞便
  - 避免到濕貨街市、活家禽市場或農場。
  - 切勿進食野味及切勿光顧有提供野味的食肆。
  
- 保持良好的個人衛生
  - 避免觸摸眼睛、口和鼻。
  - 經常保持雙手清潔。勤洗手，尤其在觸摸眼、口或鼻、處理食物或進食前、如廁後、觸摸公共物件如電梯扶手、升降機按鈕或門柄後，或當手被呼吸道分泌物污染時，如咳嗽或打噴嚏後。
  - 洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少 20 秒，用水過清並用抹手紙弄乾。
  - 如沒有洗手設施，或雙手沒有明顯污垢時，使用含 70 至 80% 的酒精搓手液潔淨雙手亦為有效方法。
  - 打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩蓋口鼻。不要隨地吐痰或亂拋垃圾，痰涎應用紙巾包好，把用過的紙巾棄置於有蓋的垃圾箱內，然後徹底清潔雙手。
  - 如出現發燒及／或呼吸道感染病徵如咳嗽、打噴嚏、喉嚨痛或肌肉疼痛，應戴上外科口罩，並儘早求醫。
  - 一般而言，一般市民並不建議於社區中使用 N95 呼吸器，因為正確佩戴或卸除 N95 呼吸器需接受特別訓練，若使用不當，反而會因為保護不足和污染而增加感染風險。
  - 如身體不適，避免前往人多擠逼、空氣流通情況欠佳的公眾地方。
  
- 保持良好的環境衛生
  - 確保室內空氣流通。
  - 最少每星期徹底清潔家居一次，可使用 1 比 99 稀釋家用漂白水（以 10 毫升 5.25% 次氯酸鈉家用漂白水混和於 990 毫升清水內）清洗非金屬表面，待 15 至 30 分鐘後，再用清水清洗。金屬表面則可用 70% 火酒清潔消毒。
  - 當物品表面或地面被呼吸道分泌物、嘔吐物或排泄物污染時，應先用吸水力強的即棄抹巾清除可見的污垢，然後再用適當的消毒劑清潔消毒受污染及其附近地方，非金屬表面可使用 1 比 49 稀釋家用漂白水（以 10 毫升含 5.25% 次氯酸鈉漂白水混和於 490 毫升清水內）作清

潔消毒，待 15 至 30 分鐘後，用水清洗並抹乾。金屬表面則可用 70% 火酒清潔消毒。應預防隔氣彎管乾涸及定期消毒排水口（約每星期一次）。

- 妥善保養排水渠管和定期（約每星期一次）把約半公升的清水注入每一排水口 (U型隔氣口)，以確保環境衛生。詳情請參閱:

[https://www.chp.gov.hk/files/pdf/make\\_sure\\_the\\_trap\\_is\\_not\\_dry\\_chi.pdf](https://www.chp.gov.hk/files/pdf/make_sure_the_trap_is_not_dry_chi.pdf)

- 保持健康生活模式
  - 增強身體抵抗力及實踐健康生活，包括均衡飲食、恆常運動及充足休息。
  - 不要吸煙及避免飲酒。

### 詳情

- 請瀏覽衛生防護中心專題網頁：

<https://www.chp.gov.hk/tc/features/102465.html>

衛生防護中心

二零二零年一月十五日

（二零二零年一月二十一日最後更新）